AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE CPPAP N° 523 AD

EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE » (BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

OSGES)

ABONNEMENT ANNUEL: 60 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, rue des Mineurs 67070 STRASBOURG CEDEX C. C. P. STRASBOURG 55-08 00 F

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX Tél. (88) 61.49.50 Poste 454

Bulletin nº 27

12 août 1980

GRANDES CULTURES /

- HOUBLON -

MILDIOU

Les averses orageuses qui intéressent nos régions sont à même de favoriser un développement rapide du mildiou. Les cônes étant en végétation active, il importe de les protéger aussi efficacement que possible. En conséquence, renouveler le traitement fongicide dès le début de la semaine prochaine. Veiller à bien mouiller l'ensemble des lianes.

OIDIUM

Dans les houblonnières où cette maladie est présente, même si elle est jugée sans gravité pour l'instant, ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-mildiou.

PUCERONS - ARAIGNEES ROUGES

Des observations visuelles régulières doivent être poursuivies dans les cultures afin de suivre l'évolution des pucerons ainsi que celle des araignées rouges (ces dernières sont en progression), afin de pouvoir intervenir suffisamment tôt si nécessaire (consulter notre bulletin n° 26 du 5 août).

/ CULTURES MARAICHERES /

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Les vols de la troisième génération ont débuté dans nos élevages depuis la semaine dernière. Les toutes premières mines sont visibles sur feuilles. Un nouveau traitement insecticide est conseillé dès réception de la présente note. Sur poireaux hâtifs, respecter scrupuleusement les délais d'emploi avant la récolte.

- VIGNE -

TORDEUSES DE LA GRAPPE

L'activité des papillons de cette deuxième génération d'Eudémis et de Cochylis est importante, bien qu'elle soit irrégulière d'une région à l'autre du vignoble. De nombreuses pontes sont déposées et les premières pénétrations d'Eudémis sont maintenant observées dans le Sud du vignoble.

• • • / • • •

THIAULT Directeur-Gérant : 1 et LORRAINE" TION "ALSACE ST IA 日 IMPRIMERIE Le traitement mettant en œuvre des produits à action curative est à réaliser dans les périodes suivantes :

- <u>dès réception</u> pour les vignobles du BOLLENBERG, de SOULTZMATT et de WESTHALTEN (Haut-Rhin),
- du 18 au 20 août pour les autres vignobles du Haut-Rhin ainsi que dans le vignoble de CLEEBOURG (prédominance à Cochylis) et dans le Toulois.

Ce même traitement est à réaliser dans les parcelles ayant fait l'objet d'une intervention contre la Cochylis en préventif (notre bulletin n° 26 du 5 août 1980).

- du 20 au 22 août pour l'ensemble du vignoble Bas-Rhinois.

Traiter avec beaucoup de soin en bien visant les grappes.

OIDIUM

L'oïdium commence à prendre de l'extension. Assurer une nouvelle couverture, de préférence par poudrage.

TETRANYQUES (araignées rouges et jaunes)

En ce qui concerne ces ravageurs, nous rappelons les termes de notre dernier bulletin.

Une observation attentive de la face inférieure des feuilles doit permettre de déceler leur présence éventuelle.

Dans le Sud du vignoble, certaines parcelles sont infestées d'araignées jaunes. Dans ce cas, intervenir sans retard avec un acaricide spécifique sans mélange avec d'autres produits.

REPONDEURS TELEPHONIQUES /

the state of the part of the state of the st

- secteur Alsace : (88) 60.30.10 - secteur Lorraine : (8) 337.45.98

> L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire "ALSACE et LORRAINE"

> > J. HARRANGER